

¿Con qué frecuencia?



Metotrexato*



Hidroxicloroquina



Leflunomida



Sulfasalazina



Golimumab



Adalimumab



Certolizumab



Etanercept



*También disponible en inyección.

Rituximab



Infliximab



Abatacept*



Tocilizumab



¿Cuán pronto?

Estos medicamentos no funcionan inmediatamente. En general, estos medicamentos comienzan a trabajar entre 2 y 12 semanas.



Metotrexato



Hidroxiclороquina



Leflunomida



Sulfasalazina



Golimumab



Adalimumab



Certolizumab



Etanercept



Rituximab



Infliximab



Abatacept



Tocilizumab



Costos

Costo promedio al mes.
Lo que usted pague dependerá de su seguro.



**Metotrexato
(Rheumatrex®
o Trexall®)**

\$35 a \$395

**Hidroxicloroquina
(Plaquenil®)**

\$30 a \$195

**Leflunomida
(Arava®)**

\$430 a \$675

**Sulfasalazina
(Azulfidine®)**

\$20 a \$155



**Golimumab
(Simponi®)**

\$1,985

**Adalimumab
(Humira®)**

\$1,830

**Certolizumab
(Cimzia®)**

\$3,510

**Etanercept
(Enbrel®)**

\$1,865



**Rituximab
(Rituxan®)**

\$1,105

**Infliximab
(Remicade®)**

\$790 a \$3,765

**Abatacept
(Orencia®)**

\$1,185 a \$2,365

**Tocilizumab
(Actemra®)**

\$1,115 a \$2,230

Efectos secundarios



Metotrexato Hidroxicloroquina Leflunomida Sulfasalazina

Comunes:

Hidroxicloroquina - malestar estomacal, diarrea

Metotrexato, leflunomida, sulfasalazina - malestar estomacal, diarrea, dolor de cabeza, sarpullido, inflamación del hígado, síntomas del resfriado

Raros y graves (menos de 1 por 100 personas):

Hidroxicloroquina - problemas de los ojos

Metotrexato - inflamación de los pulmones

Leflunomida - lesiones graves del hígado

Sulfasalazina - reacción severa de la piel, baja cuenta de los glóbulos en la sangre



Golimumab Adalimumab Certolizumab Etanercept

Comunes: Enrojecimiento o dolor donde la aguja penetra la piel, malestar estomacal, dolor de cabeza, mareos, presión alta.

Raros y graves (menos de 1 por 100 personas): Reactivación de la tuberculosis, infección grave que necesita antibióticos por vena en el hospital, o cáncer (frecuentemente en la piel o en la sangre, como el linfoma).



Rituximab Infliximab Abatacept Tocilizumab

Comunes: Reacción a la infusión, malestar estomacal, dolor de cabeza, mareos, presión alta.

Raros y graves (menos de 1 por 100 personas): Reactivación de la tuberculosis, infección grave que necesita antibióticos por vena en el hospital, cáncer (frecuentemente en la piel o en la sangre, como el linfoma) o reacción grave a la infusión.

Consideraciones

La mayoría de estos medicamentos NO deben tomarse si está planeando un embarazo, tiene tuberculosis (TB) activa o exposición a la TB, bebe alcohol, o tiene una enfermedad del hígado. Es muy importante hablar con su médico sobre estos temas antes de elegir un medicamento.



Metotrexato



Hidroxicloroquina



Leflunomida



Sulfasalazina



Golimumab

Adalimumab

Certolizumab

Etanercept



Rituximab

Infliximab

Abatacept

Tocilizumab

