


Sueño

Algunas personas tratadas con antidepresivos pueden experimentar sueño excesivo o insomnio.




Esta herramienta para la toma de decisiones no ha sido financiada por ninguna compañía farmacéutica de salud o de tecnología médica con fines de lucro.

© 2011 Mayo Foundation for Medical Education and Research. Todos los derechos reservados. MC5733-41SP

Cambio de peso

Algunas personas pueden tener cambios en su peso. Esto es más probable que ocurra en los primeros seis a doce meses de tratamiento y depende de su peso actual. La tabla a continuación se basa en una persona de 150 libras (68 kilos) de peso.




Esta herramienta para la toma de decisiones no ha sido financiada por ninguna compañía farmacéutica de salud o de tecnología médica con fines de lucro.

© 2011 Mayo Foundation for Medical Education and Research. Todos los derechos reservados. MC5733-37SP

Dejar de tomar la medicina

Dejar de tomar el antidepresivo de un día para otro podría causar que usted se sienta enfermo, como si tuviera gripe (p.ej. dolor de cabeza, mareo, náuseas o ansiedad)




Esta herramienta para la toma de decisiones no ha sido financiada por ninguna compañía farmacéutica de salud o de tecnología médica con fines de lucro.

© 2011 Mayo Foundation for Medical Education and Research. Todos los derechos reservados. MC5733-38SP

Problemas sexuales













Algunas personas tratadas con antidepresivos pueden experimentar pérdida del deseo sexual (líbido) o pérdida de la habilidad de alcanzar el orgasmo.



Costo

Estos son costos estimados y sirven únicamente como referencia. El costo real que usted tendría que pagar puede variar dependiendo de cuándo las compre, la farmacia, su seguro médico, la dosis y la preparación de la medicina.

Menos  Más

ISRS	Citalopram (Celexa®)	— 	\$4 / mes – Programa de medicinas de grandes almacenes
	Escitalopram (Lexapro®)	— 	\$110 / mes
	Fluoxetina (Prozac®)	— 	\$4 / mes – Programa de medicinas de grandes almacenes
	Fluvoxamina (Luvox®)	— 	\$80 / mes
	Paroxetina (Paxil®)	— 	\$4 / mes – Programa de medicinas de grandes almacenes
	Sertralina (Zoloft®)	— 	\$29 / mes
No ISRS	Desvenlafaxina (Pristiq®)	— 	\$147 / mes – Medicina genérica no disponible
	Duloxetina (Cymbalta®)	— 	\$154 / mes – Medicina genérica no disponible
	Venlafaxina (Effexor®)	— 	\$130 / mes
Otros	Bupropion (Wellbutrin®)	— 	\$100 / mes
	Mirtazapina (Remeron®)	— 	\$50 / mes
ATC	Amiptriptilina o Nortriptilina (Elavil® o Aventyl HCl®)	— 	\$4 / mes – Programa de medicinas de grandes almacenes

A tomar en cuenta

Los antidepresivos pueden causar:

- Estreñimiento, diarrea, náuseas
- Aumento de ideas suicidas e intentos suicidas (18 a 24 años)
- Daño al embrión durante el embarazo
- Riesgo de desarrollar síndrome serotoninérgico, una condición que puede ser mortal (*aunque es menos frecuente)
- Posible interacción con otras medicinas

Adicionalmente

ISRS	Citalopram (Celexa®)	Puede causar problemas en el corazón
	Escitalopram (Lexapro®)	Actualmente no presenta problemas
	Fluoxetina (Prozac®)	Mayor probabilidad de interacción con otras medicinas que usted esté tomando
	Fluvoxamina (Luvox®)	Mayor probabilidad de causar estreñimiento, diarrea o náuseas No está oficialmente reconocido como un tratamiento para la depresión
	Paroxetina (Paxil®)	Mayor probabilidad de causar daño al embrión durante el embarazo
	Sertralina (Zoloft®)	Mayor probabilidad de causar diarrea
No ISRS	Desvenlafaxina (Pristiq®)	Dígale a su médico si usted tiene presión alta
	Duloxetina (Cymbalta®)	Puede ayudar con el dolor Dígale a su médico si usted tiene presión alta
	Venlafaxina (Effexor®)	Mayor probabilidad de causar náuseas y vómitos Puede causar problemas en el corazón Dígale a su médico si usted tiene presión alta
Otros	Bupropion (Wellbutrin®)	Alto riesgo de convulsiones
	Mirtazapina (Remeron®)	Empieza a actuar más rápido que otras medicinas
ATC	Amiptriptilina o Nortriptilina (Elavil® o Aventyl HCl®)	Mayor probabilidad de causar estreñimiento, diarrea o náuseas Puede ayudar con el dolor Si usted es adulto mayor, esta medicina puede no ser la mejor opción

Esta herramienta para la toma de decisiones no ha sido financiada por ninguna compañía farmacéutica de salud o de tecnología médica con fines de lucro.

© 2011 Mayo Foundation for Medical Education and Research. Todos los derechos reservados. MC5733-425P

Qué debería saber

¿Es esta medicina la más apropiada para mí?

- Todos los antidepresivos presentados en esta herramienta de decisión son igualmente eficaces para tratar la depresión.
- La mayoría de gente con depresión encuentra un antidepresivo que los hace sentir mejor.
- 6 de cada 10 personas se sentirán mejor con el primer antidepresivo y los otros 4 tendrán que probar otros antidepresivos hasta encontrar el correcto para ellos.

¿Cuánto tiempo tengo que esperar para sentirme mejor?

- Para comenzar a sentir el efecto completo del tratamiento, la mayoría de personas con depresión necesita tomar regularmente el antidepresivo al menos por 6 semanas.

¿Hasta cuando tendré efectos secundarios?

- La mayoría de personas que toma antidepresivos tiene por lo menos un efecto adverso.
- Muchos efectos secundarios desaparecen después de algunas semanas de uso; sin embargo, otros efectos solo desaparecen al dejar de tomar la medicina.